

植被病虫害遥感监测与预测报告

[2024] 第 1 期 总 91 期

中国科学院空天信息创新研究院

中国科学院数字地球重点实验室

农业生态大数据分析与应用技术国家地方联合工程研究中心

遥感科学国家重点实验室

林草生物灾害监测预警国家林草局重点实验室

中英作物病虫害测报与防控联合实验室

农业农村部航空植保重点实验室

2024 年 5 月

全球小麦主产国病虫害遥感监测与预测结果显示：

今年 5 月进入小麦中后期生长阶段的主产国锈病和蚜虫累计发生面积
约 3.73 亿亩，总体而言虫害重于病害

中国科学院空天信息创新研究院综合利用国内高分（GF）系列、美国 MODIS 和 Landsat TM、欧盟 Sentinel 系列等卫星遥感数据，结合气象数据和地面植保调查数据，依托自主研发的植被病虫害遥感监测与预测系统，开展全球植被重大病虫害遥感监测与预测，并定期在线发布病虫害遥感专题图和科学报告。

本期报告重点对 2024 年 5 月全球进入小麦中后期生长阶段的主产国病虫害发生情况进行了遥感监测与预测。研究结果表明，小麦主产国锈病和蚜虫预计累计发生面积约 3.73 亿亩，主要发生在印度、俄罗斯、美国、哈萨克斯坦、加拿大、巴基斯坦、土耳其、伊朗、乌克兰、法国、德国、摩洛哥、波兰、阿富汗、罗马尼亚、西班牙、意大利、英国、伊拉克和乌兹别克斯坦，其中锈病预计发生面积约 1.23 亿亩，占总种植面积的 5.4%，蚜虫预计发生面积约 2.50 亿亩，占总种植面积的 10.9%，总体而言虫害重

于病害。各国小麦主要病虫害的空间分布情况和发生面积具体监测与预测结果如下。

1、小麦锈病

印度小麦种植面积约 4.7 亿亩，其中锈病预计发生面积约 1897 万亩，占总种植面积的 4%，主要分布于印度河平原和恒河平原；俄罗斯小麦种植面积约为 4.2 亿亩，其中锈病预计发生面积约 1675 万亩，占总种植面积的 4%，主要分布于高加索地区；美国小麦种植面积约为 2.3 亿亩，其中锈病预计发生面积约 2030 万亩，占总种植面积的 9%，主要分布于大平原北部和五大湖周边；哈萨克斯坦小麦种植面积约为 1.9 亿亩，其中锈病预计发生面积约 572 万亩，占总种植面积的 3%，主要分布于北部地区；加拿大小麦种植面积约为 1.4 亿亩，其中锈病预计发生面积约 832 万亩，占总种植面积的 6%，主要分布于南部地区；巴基斯坦小麦种植面积约为 1.4 亿亩，其中锈病预计发生面积约 1238 万亩，占总种植面积的 9%，主要分布于旁遮普省中部及俾路支省东部地区；土耳其小麦种植面积约为 1.0 亿亩，其中锈病预计发生面积约 397 万亩，占总种植面积的 4%，主要分布于东南安那托利亚地区；伊朗小麦种植面积约为 1.0 亿亩，其中锈病预计发生面积约 1165 万亩，占总种植面积的 12%，主要分布于西部与北部地区；乌克兰小麦种植面积约为 1.1 亿亩，其中锈病预计发生面积约 426 万亩，占总种植面积的 4%，主要分布于南部小麦产区；法国小麦种植面积约为 0.8 亿亩，其中锈病预计发生面积约 554 万亩，占总种植面积的 7%，主要分布于北部小麦产区；德国小麦种植面积约为 0.4 亿亩，其中锈病预计发生面积约 220 万亩，占总种植面积的 5%，主要分布于东南部小麦产区；摩洛哥小麦种植面积约为 0.4 亿亩，其中锈病预计发生面积约 129 万亩，占总种植

面积的 3%，主要分布于北部地区；波兰小麦种植面积约为 0.4 亿亩，其中锈病预计发生面积约 143 万亩，占总种植面积的 4%，主要分布于中北部小麦甘蔗产区和西部小麦产区；阿富汗小麦种植面积约为 0.3 亿亩，其中锈病预计发生面积约 220 万亩，占总种植面积的 8%，主要分布于东北部地区；罗马尼亚小麦种植面积约为 0.3 亿亩，其中锈病预计发生面积约 65 万亩，占总种植面积的 2%，主要分布于西部地区；西班牙小麦种植面积约为 0.3 亿亩，其中锈病预计发生面积约 128 万亩，占总种植面积的 4%，主要分布于北部、东部及南部地区；意大利小麦种植面积约为 0.3 亿亩，其中锈病预计发生面积约 104 万亩，占总种植面积的 4%，主要分布于中南部地区；英国小麦种植面积约为 0.3 亿亩，其中锈病预计发生面积约 188 万亩，占总种植面积的 7%，主要分布于东南部小麦大麦混合区；伊拉克小麦种植面积约为 0.2 亿亩，其中锈病预计发生面积约 167 万亩，占总种植面积的 7%，主要分布于东南部地区；乌兹别克斯坦小麦种植面积约为 0.2 亿亩，其中锈病预计发生面积约 130 万亩，占总种植面积的 7%，主要分布于东部谷物产区。各国病害空间分布情况和发生面积见图 1 和表 1。



图 1 2024 年全球小麦锈病遥感预测结果

2、小麦蚜虫

印度小麦蚜虫预计发生面积约 1897 万亩，占总种植面积的 4%，主要分布于印度河平原和恒河平原；俄罗斯小麦蚜虫预计发生面积约 5025 万亩，占总种植面积的 12%，主要分布于高加索地区；美国小麦蚜虫预计发生面积约 2933 万亩，占总种植面积的 13%，主要分布于大平原北部地区；哈萨克斯坦小麦蚜虫预计发生面积约 954 万亩，占总种植面积的 5%，主要分布于北部小麦产区；加拿大小麦蚜虫预计发生面积约 1110 万亩，占总种植面积的 8%，主要分布于南部小麦产区；巴基斯坦小麦蚜虫预计发生面积约 825 万亩，占总种植面积的 6%，主要分布于印度河下游地区及旁遮普大部；土耳其小麦蚜虫预计发生面积约 1987 万亩，占总种植面积的 20%，主要分布于中部安那托利亚地区、东安那托利亚地区和东南安那托利亚地区；伊朗小麦蚜虫预计发生面积约 3010 万亩，占总种植面积的 31%，主要分布于西部与北部区域；乌克兰小麦蚜虫预计发生面积约 1704 万亩，占总

种植面积的 16%，主要分布于南部小麦产区和东部小麦产区；法国小麦蚜虫预计发生面积约 1029 万亩，占总种植面积的 13%，主要分布于西部玉米、大麦和油菜混种区、西南玉米区、中部干旱区及地中海气候区；德国小麦蚜虫预计发生面积约 309 万亩，占总种植面积的 7%，主要分布于中部小麦种植区、东部稀疏作物区及南部高原区；摩洛哥小麦蚜虫预计发生面积约 1117 万亩，占总种植面积的 26%，主要分布于西南部地区；波兰小麦蚜虫预计发生面积约 251 万亩，占总种植面积的 7%，主要分布于中部黑麦马铃薯产区和中北部小麦甘蔗产区；阿富汗小麦蚜虫预计发生面积约 495 万亩，占总种植面积的 18%，主要分布于东北部地区；罗马尼亚小麦蚜虫预计发生面积约 587 万亩，占总种植面积的 18%，主要分布于南部和西部地区；西班牙小麦蚜虫预计发生面积约 766 万亩，占总种植面积的 24%，主要分布于西南部地区；意大利小麦蚜虫预计发生面积约 518 万亩，占总种植面积的 20%，主要分布于中部及南部地区；英国小麦蚜虫预计发生面积约 107 万亩，占总种植面积的 4%，主要分布于南方小麦大麦混合区；伊拉克小麦蚜虫预计发生面积约 119 万亩，占总种植面积的 5%，主要分布于东北部地区；乌兹别克斯坦小麦蚜虫预计发生面积约 242 万亩，占总种植面积的 13%，主要分布于东南部谷物产区。各国虫害空间分布情况和发生面积见图 2 和表 1。



图 2 2024 年全球小麦蚜虫遥感预测结果

表 1 2024 年全球小麦病虫害预测发生面积统计

国家	锈病预测发生面积及比例		蚜虫预测发生面积及比例		总种植面积 / 亿亩
	面积 / 万亩	比例 / %	面积 / 万亩	比例 / %	
印度	1897	4	1897	4	4.7
俄罗斯	1675	4	5025	12	4.2
美国	2030	9	2933	13	2.3
哈萨克斯坦	572	3	954	5	1.9
加拿大	832	6	1110	8	1.4
巴基斯坦	1238	9	825	6	1.4
土耳其	397	4	1987	20	1
伊朗	1165	12	3010	31	1
乌克兰	426	4	1704	16	1.1
法国	554	7	1029	13	0.8
德国	220	5	309	7	0.4
摩洛哥	129	3	1117	26	0.4
波兰	143	4	251	7	0.4
阿富汗	220	8	495	18	0.3
罗马尼亚	65	2	587	18	0.3
西班牙	128	4	766	24	0.3
意大利	104	4	518	20	0.3
英国	188	7	107	4	0.3
伊拉克	167	7	119	5	0.2
乌兹别克斯坦	130	7	242	13	0.2

本报告由黄文江研究员、董莹莹副研究员带领的植被遥感机理与病虫害应用团队完成。

中方主要贡献者：黄文江、董莹莹、叶回春、王昆、王少华、张弼尧、李雪玲、聂超甲、焦全军、张竞成、赵龙龙、黄林生、王慧芳、竞霞、杜世州、崔贝、彭代亮、杜小平、刘林毅、马慧琴、郭安廷、阮超、耿芸、常红、肖颖欣、郝卓青、钱彬祥、覃祥美、黄滢茹、张寒苏、孙瑞祺、卢龙辉、侯瑞、郭静、赵铭现、赵静、邢乃琛、雒培磊、孔维平、陈鑫雨、徐云蕾、汪靖、郭佳炜、乔树亭、师越、刘越、罗菊花、赵晋陵、郑琮、任涓、孙忠祥、黄铁成、李永康、胡廷广、金玉、丁超、吴康、刘勇、吴波、胡博海、任珂辉、成湘哲、芦奇宝、孔繁楚、尚俊呈、张东彦、杨小冬、蒙艳华、范闻捷、孙刚、武彬、张清、王大成、冯伟、周贤锋、黄木易、江静、吴照川、唐翠翠、徐芳、李健丽、刘文静、鲁军景、宋富冉、管青松、杨勤英、刘创、韩芸俐、邹玉珍、李璐。

外方主要贡献者：Belinda Luke, Hongmei Li, Bethan Perkins, Bryony Taylor, Wenhua Chen, Pablo Gonzalez Moreno, Sarah Thomas, Timothy Holmes, Stefano Pignatti, Giovanni Laneve, Raffaele Casa, Simone Pascucci, Martin Wooster, Jason Chapman.

指导专家：张兵、王纪华、兰玉彬、杨普云、陈仲新、方国飞、朱景全、黄敬峰、柴守权、吴文斌、姜玉英、秦其明、吴开华、谢巧云、任彬元、郭安红、马占鸿、周益林、涂雄兵、张峰、王志国、吴丽芳、梁栋、Yanbo Huang、Chenghai Yang、Liangxiu Han、Ruiliang Pu、Jiali Shang、Hugh Mortimer、Jon Styles、Andy Shaw、Jadu Dash.

主要资助项目：国家重点研发计划项目（2023YFB3906200、2021YFE0194800），国家自然科学基金项目（42071320、42071423），“一带一路”国际科学组织联盟资助（ANSO-CR-KP-2021-06），GEO Community Activities “Global Crop Pest and Disease Habitat Monitoring and Risk Forecasting”，Dragon 6 “Optical and Thermal Copernicus - Chinese Eo Data for Analyzing the Driving Factors, Impacting on Food Security and Quality” (57457)等。

免责声明：本报告是中国科学院空天信息创新研究院植被遥感机理与病虫害应用团队的研究成果。报告中的分析结果与结论并不代表中国科学院或者空天信息创新研究院的观点。使用者可以合法引用本报告中的数据，并注明出处。但其在数据基础上所作的任何判断、推论或观点，均不代表植被遥感机理与病虫害应用团队的立场。本报告所公布的数据仅供参考，植被遥感机理与病虫害应用团队不承担因使用本期报告数据而产生的任何法律责任。报告中使用的中国边界来自中国官方数据源。

电话：010-82178178

传真：010-82178177

Email: rscrop@aircas.ac.cn

地址：北京市海淀区邓庄南路9号 中国科学院空天信息创新研究院

邮编：100094